Unenlagiinae

Les **Unenlagiinae** forment une sous-famille éteinte de dinosaures à plumes, des théropodes coelurosauriens. Ils sont connus par des spécimens découverts en Amérique du Sud, Antarctique et Madagascar, qui ont vécu pendant le Crétacé supérieur, il y a de 89 à 66 millions d'années[1,2].

Sommaire

- **Genres**
- **Voir aussi**
  - Références taxinomiques
  - Annexes
  - Article connexe
- **Références**

Genres

Les genres suivants ont été classés parmi la sous-famille des Unenlagiinae en 2011 par F. Agnolin *et al.*[3] :

- *Austroraptor*
- *Buitreraptor*
- *Neuquenraptor*
- *Rahonavis*
- *Unenlagia*

En 2015, une nouvelle analyse phylogénétique réalisée par Robert DePalma *et al.*[4], ne retient que trois genres dans la sous-famille :

- *Buitreraptor*
- *Rahonavis*
- *Unenlagia*

Le genre *Neuquenraptor* est généralement considéré comme un synonyme junior d'*Unenlagia*[5,4].

Unenlagiinae



Vue d'artiste d'*Unenlagia*.

Classification

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Classe	Sauropsida
Super-ordre	Dinosauria
Ordre	Saurischia
Sous-ordre	Theropoda
Infra-ordre	Coelurosauria
— non-classé —	Maniraptora
— non-classé —	† Deinonychosauria
Famille	† Dromaeosauridae

Sous-famille

† **Unenlagiinae**

Bonaparte, 1999

Voir aussi

Références taxinomiques

(en) Référence *Paleobiology Database* : Unenlagiinae Bonaparte, 1999 (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=68206)

Annexes

Article connexe

- *Unenlagia*

Sur les autres projets Wikimedia :

Unenlagiinae (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Unenlagiinae?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Unenlagiinae, sur Wikispecies

Références

1. **(en)** J. F. Bonaparte, « Tetrapod faunas from South America and India: a palaeobiogeographic interpretation », *Proceedings of the Indian National Science Association*, vol. 65A, nº 3, 1999, p. 427-437
2. **(en)** « Subfamily Unenlagiinae Bonaparte 1999 (coelurosaur) » (http://fossilworks.org/bridge.pl?taxon_no=68206&action=taxonInfo), sur *http://fossilworks.org/*
3. **(en)** Federico L. Agnolin et Fernando E. Novas, « Unenlagiid theropods: are they members of the Dromaeosauridae (Theropoda, Maniraptora)? », *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, vol. 83, nº 1, 2011 (DOI 10.1590/S0001-37652011000100008 (https://dx.doi.org/10.1590%2FS0001-37652011000, lire en ligne (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0001-37652011000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en)).
4. **(en)** Robert A. DePalma, David A. Burnham, Larry D. Martin, Peter L. Larson et Robert T. Bakker, « The First Giant Raptor (Theropoda: Dromaeosauridae) from the Hell Creek Formation. », *Paleontological Contributions*, nº 14, 2015 (lire en ligne (https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/18764))
5. **(en)** A. H. Turner, S. H. Hwang, and M. A. Norell. 2007. "A small derived theropod from Öösh, Early Cretaceous, Baykhangor Mongolia". *American Museum Novitates* **3557**: 1-27

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Unenlagiinae&oldid=167840606 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 26 février 2020 à 16:11.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.